

Física Atómica y Materia Condensada
Semestre 2018-2
Prof: Asaf Paris Mandoki
Ayud: Manuel Mendoza López



Tarea 5
Entrega: 23 marzo 2018

Ejercicio 1 : Marco rotante

10 Puntos

- a. Obtén las ecuaciones de movimiento para las componentes c_g y c_e del vector de estado cuántico

$$|\psi\rangle = c_g |g\rangle + c_e |e\rangle,$$

bajo la evolución dada por el Hamiltoniano

$$\hat{H} = \hbar\omega_0 |e\rangle \langle e| + \frac{\hbar\Omega}{2} (\hat{\sigma} e^{i\omega t} + \hat{\sigma}^\dagger e^{-i\omega t}).$$

- b. Has una transformación al marco rotante definiendo

$$\tilde{c}_e = c_e e^{i\omega t},$$

y reescribe las ecuaciones de movimiento en términos de \tilde{c}_e .

- c. Por otro lado, definiendo el estado cuántico del marco rotante

$$|\tilde{\psi}\rangle = c_g |g\rangle + \tilde{c}_e |e\rangle,$$

muestra que la ecuación de las componentes de este estado bajo el Hamiltoniano rotante

$$\hat{\tilde{H}} = -\hbar\delta |e\rangle \langle e| + \frac{\hbar\Omega}{2} (\hat{\sigma} + \hat{\sigma}^\dagger)$$

es equivalente a lo que obtuviste en el inciso anterior.

Ejercicio 2 : Átomo de dos niveles fuera de resonancia

25 Puntos

En clase encontramos las ecuaciones diferenciales para las componentes del vector de estado $|\psi(t)\rangle = c_g(t) |g\rangle + \tilde{c}_e(t) |e\rangle$ para el átomo de dos niveles. Éstas tienen la forma

$$\begin{aligned}\dot{c}_g &= -i\frac{\Omega}{2}\tilde{c}_e \\ \dot{\tilde{c}}_e &= -i\frac{\Omega}{2}c_g + i\delta\tilde{c}_e,\end{aligned}$$

donde $\delta = \omega - \omega_0$. En la página del curso puedes encontrar un programa que resuelve numéricamente el caso resonante ($\delta = 0$) de este problema. Modifica ese programa o escribe uno propio para graficar $P_e(t) = c_e^*(t)c_e(t)$ y $P_g(t) = c_g^*(t)c_g(t)$ para $\delta = 0, \Omega, 5\Omega, 10\Omega$ y $P_e(0) = 0$. Haz las gráficas de tal modo que te permitan comparar fácilmente entre los distintos casos. Escoge una escala de tiempo razonable que te permita observar varios periodos de oscilación.

Ejercicio 3 : Átomo de dos niveles con decaimiento

25 Puntos

Para tratar la posibilidad de el átomo realice un decaimiento espontáneo es necesario tratar el sistema de dos niveles usando matrices de densidad. Las ecuaciones de evolución obtenidas en clase para este caso fueron

$$\begin{aligned}\dot{\rho}_{ee} &= +i\frac{\Omega}{2}(\rho_{eg} - \rho_{ge}) - \Gamma\rho_{ee} \\ \dot{\rho}_{ge} &= -i\frac{\Omega}{2}(\rho_{ee} - \rho_{gg}) - i\delta\rho_{ge} - \frac{\Gamma}{2}\rho_{ge} \\ \dot{\rho}_{eg} &= +i\frac{\Omega}{2}(\rho_{ee} - \rho_{gg}) + i\delta\rho_{eg} - \frac{\Gamma}{2}\rho_{eg} \\ \dot{\rho}_{gg} &= -i\frac{\Omega}{2}(\rho_{eg} - \rho_{ge}) + \Gamma\rho_{ee}.\end{aligned}$$

Modifique el programa anterior para tratar este sistema de 4 ecuaciones diferenciales. Grafica la probabilidad de estar en el estado excitado $\rho_{ee}(t)$ para $\delta = 0, \Gamma = 0, 0.2\Omega, 0.5\Omega, \Omega, 2\Omega$ y para $\delta = 3\Omega, \Gamma = 0.2\Omega$

Haz las gráficas de tal modo que te permitan comparar fácilmente entre los distintos casos. Escoge una escala de tiempo razonable que te permita observar varios periodos de oscilación.