

Física Atómica y Materia Condensada  
 Semestre 2018-2  
 Prof: Asaf Paris Mandoki  
 Ayud: Manuel Mendoza López



Tarea 8  
 Entrega: 29 mayo 2018

Estos ejercicios contarán como puntos extra de tareas.

**Ejercicio 1** : Funciones periódicas **+20 Puntos**


Considera los puntos de una malla  $\{\mathbf{R}\}$  y una función periódica  $\rho(\mathbf{x}) = \rho(\mathbf{x}+\mathbf{R})$ . Muestra que  $\rho$  puede escribirse como

$$\rho(\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{G}} \rho_{\mathbf{G}} e^{i\mathbf{G}\cdot\mathbf{x}},$$

donde la suma es sobre todos los puntos de la malla recíproca  $\{\mathbf{G}\}$ .

**Ejercicio 2** : Preguntas conceptuales **+50 Puntos**

- ¿Qué es la primer zona de Brillouin y por qué es importante?
- De acuerdo a la teoría de bandas ¿Cómo se comporta un material cristalino que tiene un electrón por celda unitaria?
- En clase discutimos las propiedades eléctricas para materiales con uno o dos electrones de valencia por celda unitaria. ¿Qué pasa para cuatro electrones como es el caso de un cristal de carbono (diamante)?
- La estructura de un cristal de carbono y uno de silicio son iguales. ¿Por qué el cristal de carbono es transparente y el de silicio no lo es?
- Investiga y describe en términos de teoría de bandas cómo funciona un diodo y un transistor NPN.
- Dibuja la forma de la primer zona de Brillouin para la siguiente red bidimensional recíproca:



**Ejercicio 3 : Huecos**

**+30 Puntos**

- a. En teoría de bandas ¿Qué es un hueco y por qué es útil ese concepto?
- b. Un electrón cerca de la cima de la banda de valencia en un semiconductor tiene una energía  $E = -10^{-37}|\mathbf{k}|^2$  con  $E$  en joules y  $\mathbf{k}$  en  $\text{m}^{-1}$ . Un electrón es removido del estado  $\mathbf{k} = 2 \times 10^8 \text{ m}^{-1} \hat{\mathbf{x}}$ , con  $\hat{\mathbf{x}}$  un vector unitario en la dirección  $x$ . Para el hueco resultante calcula (con el signo correcto)
  - a) La masa efectiva.
  - b) La energía.
  - c) El momento.
  - d) Su velocidad.
- c. Si la densidad de huecos es  $p = 10^5 \text{ m}^{-3}$  y todos tienen casi exactamente el mismo momento, calcula la densidad de carga y su signo.