

Interacción de átomos con ondas E.M. II

Nos quedamos en (usando norma de Coulomb)

Para el átomo de hidrógeno

$$H = H_0 + \frac{e}{m} \vec{A}(\vec{r}, t) \cdot \vec{p} + \frac{e^2}{2m} A^2(\vec{r}, t)$$

$$\vec{A}(\vec{r}, t) = \int_0^\infty d\omega A_0(\omega) \hat{E} \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \delta_\omega)$$

- Para campos débiles ($\frac{e^2}{2m} A^2 \ll \frac{e}{m} \vec{A} \cdot \vec{p}$)

$$H = H_0 + H_{int}(t)$$

$$H_0 = H_{\text{átomo}}$$

$$H_{int} = \frac{e}{m} \vec{A}(\vec{r}, t) \cdot \vec{p}$$

- Usando teoría de perturbaciones dependiente del tiempo.

$$H = H_0 + \lambda H'(t) \quad \text{con} \quad \lambda H'(t) = H_{int}(t)$$

Considerando los e.V. de H_0 ; $H_0 |\psi_k\rangle = E_k |\psi_k\rangle$

$$|\psi(t)\rangle = \sum_k C_k(t) e^{-\frac{i}{\hbar} E_k t} |\psi_k\rangle$$

En el esquema de interacción:

$$\dot{C}_k(t) = -\frac{i}{\hbar} \sum_l \langle \psi_k | \lambda H'(t) | \psi_l \rangle C_l(t) e^{i\omega_{kl} t}$$

$$\omega_{kl} = \frac{E_k - E_l}{\hbar}$$

Podemos hacer expansión en serie de $C_k(t)$

$$C_k(t) = C_k^{(0)}(t) + \lambda C_k^{(1)}(t) + \lambda^2 C_k^{(2)}(t) + \dots$$

$$\dot{C}_k^{(0)}(t) = 0$$

$$\dot{C}_k^{(1)}(t) = -\frac{i}{\hbar} \sum_l \langle \psi_k | H'(t) | \psi_l \rangle C_l^{(0)}(t) e^{i\omega_{kl}t}$$

$$\dot{C}_k^{(s+1)}(t) = -\frac{i}{\hbar} \sum_l \langle \psi_k | H'(t) | \psi_l \rangle C_l^{(s)}(t) e^{i\omega_{kl}t}$$

Si el sistema está inicialmente en $|\psi_i\rangle$ en $t=0$.

$$C_k^{(0)}(t \leq 0) = \delta_{ik}$$

Usando esto:

$$\dot{C}_k^{(1)} = -\frac{i}{\hbar} \langle \psi_k | H'(t) | \psi_i \rangle e^{i\omega_{ki}t}$$



$$C_k^{(1)}(t) = -\frac{i}{\hbar} \int_0^t H'_{ki}(t') e^{i\omega_{ki}t'} dt'$$

$\langle \psi_k | H'(t) | \psi_i \rangle$

transformada de Fourier

$$P_{i \rightarrow k}^{(1)}(t) = |C_k^{(0)}(t) + \lambda C_k^{(1)}(t)|^2 \underset{k \neq i}{=} \frac{1}{\hbar^2} \left| \int_0^t \lambda H'_{ki}(t') e^{i\omega_{ki}t'} dt' \right|^2$$

$f(t)$ $F(\omega)$



La población del estado inicial

$$C_i(t) \approx C_i^{(0)} + \lambda C_i^{(1)}(t) = 1 - \frac{i}{\hbar} \int_0^t \lambda H'_{ii}(t') dt'$$

$$\approx \exp\left(-\frac{i}{\hbar} \int_0^t \lambda H'_{ii}(t') dt'\right)$$

$$P_i^{(1)}(t) = |C_i(t)|^2 \approx 1$$

T. de perturbaciones dependiente del tiempo sólo es válida para tiempos cortos por lo que la usaremos sólo para obtener

$$\text{Tasa de transición } R = \frac{d}{dt} P_{i \rightarrow k}(0)$$

Y no toda la dinámica.

... Regresando a nuestro problema

$$\lambda C_k^{(1)}(t) = -\frac{i}{\hbar} \int_0^t \lambda H'_{ka}(t') e^{i\omega_{ki}t'} dt'$$

$$= -\frac{e}{m_0} \int_0^t \langle \psi_k | \vec{A}(\vec{r}, t) \cdot \vec{\nabla} | \psi_i \rangle e^{i\omega_{ki}t'} dt'$$

Usando $\vec{A}(\vec{r}, t) = \int_0^\infty d\omega A_0(\omega) \hat{E} \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \delta_\omega)$

$$\lambda C_k^{(1)}(t) = -\frac{e}{m_0} \int_0^\infty d\omega A_0(\omega) \left[e^{i\delta_\omega} \langle \psi_k | e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \hat{E} \cdot \vec{\nabla} | \psi_i \rangle \int_0^t dt' e^{i(\omega_{ki} - \omega)t'} \right. \\ \left. + e^{-i\delta_\omega} \langle \psi_k | e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} \hat{E} \cdot \vec{\nabla} | \psi_i \rangle \int_0^t dt' e^{i(\omega_{ki} + \omega)t'} \right]$$

Hay 2 casos donde las integrales de t' no son cero

• $\omega_{ki} - \omega \approx 0$ $E_k \approx E_i + \hbar\omega$ (absorción)

• $\omega_{ki} + \omega \approx 0$ $E_k \approx E_i - \hbar\omega$ (emisión)

- Absorción

$$P_{i \rightarrow k}^{(1)}(t) = |\lambda C_k^{(1)}(t)|^2 = \left| \frac{e}{m} \int_0^\infty d\omega A_0(\omega) e^{i\delta\omega} \langle \psi_k | e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} \hat{\epsilon} \cdot \vec{\nabla} | \psi_i \rangle \int_0^t dt' e^{i(\omega_{ki} - \omega)t'} \right|^2$$

$$\approx \frac{1}{2} \left(\frac{e}{m} \right)^2 \int_0^\infty d\omega A_0^2(\omega) |M_{ki}(\omega)|^2 F(t, \omega_{ki} - \omega)$$

Para luz incoherente
o también
monocromática.

$$M_{ki}(\omega) = \langle \psi_k | e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} \hat{\epsilon} \cdot \vec{\nabla} | \psi_i \rangle$$

$$F(t, \omega) = \frac{1 - \cos(\omega t)}{\omega^2} = \frac{1}{2} \left| \int_0^t e^{i\omega t'} dt' \right|^2$$

$$\approx \frac{1}{2} \left(\frac{e}{m} \right)^2 \underbrace{A_0^2(\omega_{ki}) |M_{ki}(\omega_{ki})|^2}_{\text{Porque } F(t, \omega) \text{ actúa como una } \delta(\omega)} \int_{-\infty}^{\infty} F(t, \omega) d\omega$$

Porque $F(t, \omega)$
actúa como una
 $\delta(\omega)$

integrando de
 $-\infty$ a ∞
queda πt

$$= \frac{\pi}{2} \left(\frac{e}{m} \right)^2 A_0^2(\omega_{ki}) |M_{ki}(\omega_{ki})|^2 t$$

