

Efectos mecánicos de luz sobre átomos.

En aproximación dipolar.

\mathcal{E} varía lentamente en el espacio

$$\mathcal{E}(\vec{x}, t) = \hat{\epsilon} \frac{\hat{\mathcal{E}}_0(\vec{x})}{z} (e^{-i\omega t} + e^{i\omega t}) = \mathcal{E}^{(+)}(\vec{x}, t) + \mathcal{E}^{(-)}(\vec{x}, t)$$

$$\Omega(\vec{x}) = \frac{-2 \langle g | \hat{\epsilon} \cdot \vec{d} | e \rangle}{\hbar} \vec{\mathcal{E}}_0^{(+)}(\vec{x})$$

Haciendo la aproximación de onda rotante y la transformación al marco rotante

$$H_{\text{int}} = \frac{\hbar}{2} (\Omega^*(\vec{x}) \sigma + \Omega(\vec{x}) \sigma^+)$$

Usando la ecuación de Heisenberg

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{i}{\hbar} [H, \vec{p}] =$$

$$\begin{aligned} \langle \vec{F} \rangle &= \left\langle \frac{i}{\hbar} [H, \vec{p}] \right\rangle_{\vec{p} = -i\hbar \vec{\nabla}} = \langle [H, \vec{\nabla}] \rangle = \int \psi^\dagger(\vec{x}) H_{\text{int}} \nabla \psi(\vec{x}) d^3x \\ &\quad - \int \psi^\dagger(\vec{x}) \nabla (H_{\text{int}} \psi(\vec{x})) d^3x \\ &= \dots = - \langle \nabla H_{\text{int}} \rangle \end{aligned}$$

Para facilitar la interpretación $\Omega(\vec{x}) = |\Omega(\vec{x})| e^{i\phi(\vec{x})}$

$$\begin{aligned} \nabla \Omega &= \nabla (|\Omega| e^{i\phi}) = (\nabla |\Omega|) e^{i\phi} + \underbrace{i|\Omega| (\nabla \phi)}_{\Omega} e^{i\phi} \\ &= \Omega \left(\frac{\nabla |\Omega|}{|\Omega|} + i \nabla \phi \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \langle F \rangle &= -\langle \nabla H_{int} \rangle = -\frac{\hbar}{2} \Omega^* \left(\frac{\nabla |\Omega|}{|\Omega|} - i \nabla \phi \right) \langle \sigma \rangle + \quad (*) \\ &\quad - \frac{\hbar}{2} \Omega \left(\frac{\nabla |\Omega|}{|\Omega|} + i \nabla \phi \right) \langle \sigma^+ \rangle \quad \uparrow \end{aligned}$$

En el caso en que el átomo se mueve lentamente respecto a las variaciones del campo:

$$V_{\text{átomo}} \ll L \Gamma, L \Omega$$

tasa de decaimiento \swarrow
 \nwarrow escala de variación del campo E

Podemos suponer que si al canza su estado estacionario y $\tilde{\rho}_{ge}(t \rightarrow \infty)$ para evaluar $\langle \sigma \rangle$ y $\langle \sigma^+ \rangle$

$$\begin{aligned} \tilde{\rho}_{eg} &= -\frac{i\Omega}{\Gamma} \frac{1 + \frac{i2\delta}{\Gamma}}{1 + (\frac{2\delta}{\Gamma})^2 + 2\frac{|\Omega|^2}{\Gamma^2}} = -\frac{i\Omega}{2(\Gamma/2 - i\delta)(1+s)} \\ \tilde{\rho}_{ge} &= \frac{i\Omega^*}{2(\Gamma/2 + i\delta)(1+s)}, \end{aligned}$$

\nwarrow Parámetro de saturación
 $S(\vec{x}) = \frac{|\Omega(\vec{x})|^2}{2[(\Gamma/2)^2 + \delta^2]}$

Sustituyendo en (*) obtenemos

$$\langle \vec{F} \rangle = \frac{hs}{1+s} \left[-\delta \frac{\nabla |\Omega|}{|\Omega|} + \frac{\Gamma}{2} \nabla \phi \right] = \langle F_{\text{dip}} \rangle + \langle F_{\text{rad}} \rangle$$

$$\text{con } s = \frac{|\Omega|^2}{2[(\Gamma/2)^2 + \delta^2]}$$

$$\frac{s}{1+s} \approx \frac{s}{s \ll 1}$$

• ¿Qué pasa cuando $\delta = 0$? (Para $|\Omega| \ll \Gamma$)


$$\langle F_{\text{dip}} \rangle = 0 \quad \langle F_{\text{rad}} \rangle \text{ es máximo}$$

• ¿Qué pasa cuando $\delta \gg \Gamma$?

$$\langle F_{\text{rad}} \rangle \sim \frac{1}{\delta^2} \quad \langle F_{\text{dip}} \rangle \sim \frac{1}{\delta}$$

- Fuerza radiativa

Ejemplo con haz Gaussiano | Onda plana




$\phi(\vec{x}) = \vec{x} \cdot \vec{k}$

$\nabla \phi = \vec{k}$

$\langle F_{\text{rad}} \rangle = \Gamma \rho(\vec{x}, t \rightarrow \infty) h \vec{k}$

¿Que hace la fuerza radiativa con haces estructurados?






- Fuerza dipolar

La podemos escribir como

$$\langle F_{dip} \rangle = - \frac{\hbar \delta}{2} \nabla \log(1 + S) = - \nabla V_{dip}$$

Par $\delta \gg \Gamma$, $\delta \gg |\Omega|$

$$V_{dip} \approx \frac{\hbar |\Omega(x)|^2}{4\delta}$$




El Hamiltoniano era

$$H = \hbar \begin{pmatrix} 0 & \Omega/2 \\ -\Omega/2 & -\delta \end{pmatrix}$$

$$E_{\pm} = -\frac{\hbar\delta}{2} \pm \frac{\hbar}{2} \sqrt{|\Omega|^2 + \delta^2}$$

e.V. $|+\rangle, |-\rangle$ (estados vestidos)



$I(x)$




$\Omega(x)$


Si $\delta < 0$

$E_+ \approx E_e$

$E_- \approx E_g$




Interpretación clásica con lentes




$$n_{\text{lente}} > n_{\text{aire}}$$

Si

$$n_{\text{lente}} < n_{\text{aire}}$$



- Átomos reales:



$$V_{\text{dip}} \sim |\Omega|^2$$

$$\Omega = \langle a | \hat{E} \cdot \hat{D} | b \rangle$$

Potenciales que dependen del estado.