


Átomo de 3 niveles con más detalle II: EIT



Operador de Lindblad
 $\mathcal{L}[A]\rho = A\rho A^\dagger - \frac{1}{2}(A^\dagger A \rho + \rho A A^\dagger)$

Ecuación maestra.


$$\dot{\rho}_A = \frac{1}{i\hbar} [\tilde{H}, \rho_A] + \Gamma_{31} \mathcal{L}[\sigma_{13}] \rho_A + \Gamma_{32} \mathcal{L}[\sigma_{23}] \rho_A + \gamma_{2dec} \mathcal{L}[\sigma_{22}] \rho_A + \gamma_{1dec} \mathcal{L}[\sigma_{11}] \rho_A + \gamma_{3dec} \mathcal{L}[\sigma_{33}] \rho_A$$

↑
evolución coherente

← no se pone porque el espasamiento es relativo

decoherencia (evolución no unitaria)

Transparencia inducida electromagnéticamente (EIT)



Condición $\Omega_p \ll \Omega_c, \Gamma_{21}, \Gamma_{31}$

¿Cuál es la respuesta óptica del medio respecto a la luz del láser de prueba?

Eg maestra:

$$\partial_t \tilde{\rho} = -\frac{i}{\hbar} [\tilde{H}_A + \tilde{H}_{AF}, \tilde{\rho}] + \Gamma_{31} \mathcal{L}[\sigma_1] \tilde{\rho} + \Gamma_{21} \mathcal{L}[\sigma_2] \tilde{\rho} + \gamma \mathcal{L}[\sigma_3] \tilde{\rho}$$

\uparrow
[1x1]-[2x2]

$$\partial_t \tilde{\rho}_{32} = \left(-\frac{\Gamma_{32}}{2} + i\Delta_2\right) \tilde{\rho}_{32} + \frac{i\Omega_2}{2} (\rho_{33} - \rho_{22}) - \frac{i\Omega_1}{2} \rho_{11}$$

Como

$$1 \approx \rho_{22} \gg \rho_{33}$$

$$\partial_t \tilde{\rho}_{32} \approx \left(-\frac{\Gamma_{32}}{2} + i\Delta_2\right) \tilde{\rho}_{32} - \frac{i\Omega_2}{2} - \frac{i\Omega_1}{2} \rho_{11}$$

$$\begin{aligned} \partial_t \rho_{11} &= i(\Delta_2 - \Delta_1) \rho_{11} - \gamma \rho_{11} - \frac{i\Omega_1}{2} \tilde{\rho}_{32} + \frac{i\Omega_2}{2} \tilde{\rho}_{13} \\ &\approx i(\Delta_2 - \Delta_1 + i\gamma) \rho_{11} - \frac{i\Omega_1}{2} \tilde{\rho}_{32} \end{aligned}$$

Para Ω_2 chico

ρ_{13} es chico

y $\rho_{13}\Omega_2$ es
más chico.

En el estado estacionario $\partial_t \rho = 0$
($\partial_t \rho_{11} = 0$)

$$\rho_{11} = \frac{\Omega_1 \rho_{32}}{2(\Delta_2 - \Delta_1 + i\gamma)}$$

$$\partial_t \rho_{32} = 0 \Rightarrow \left(-\frac{\Gamma_{32}}{2} + i\Delta_2\right) \tilde{\rho}_{32} - \frac{i\Omega_2}{2} - i\frac{\Omega_1}{2} \rho_{11} = 0$$

Sustituyendo $\rho_{11}(t \rightarrow \infty)$ y despejando ρ_{32}

$$\rho_{32} = \frac{i\left(\frac{\Omega_2}{2}\right) \left[(\Delta_2 - \Delta_1) + i\gamma\right]}{\left(i\Delta_2 - \Gamma_{32}/2\right) \left[(\Delta_2 - \Delta_1) + i\gamma\right] - i\left(\frac{\Omega_1}{2}\right)^2}$$


$$\rho^{(+)} = \epsilon_0 \chi E^{(+)}$$

$$\rho^{(+)} = N \langle 2 | \hat{\epsilon}_2 \cdot \vec{d} | 3 \rangle \tilde{\rho}_{32}$$

↑
densidad numérica

Sistema

Estímulo



$$\chi = \frac{-iN \langle 2 | \hat{\epsilon}_2 \cdot \vec{d} | 3 \rangle^2}{\epsilon_0 \hbar} \frac{[(\Delta_2 - \Delta_1) + i\gamma]}{\left(i\Delta_2 - \Gamma_{32}/2\right) \left[(\Delta_2 - \Delta_1) + i\gamma\right] - i\left(\frac{\Omega_1}{2}\right)^2}$$

$$n_{\text{ref}} = \sqrt{\epsilon \mu} \approx \sqrt{1 + \chi} = 1 + \chi/2$$

medio no magnético

$$\epsilon = 1 + \chi$$

Atrappamiento Coherente de población

$$\hat{H}_A = \hbar \Delta_1 |1\rangle\langle 1| + \hbar \Delta_2 |2\rangle\langle 2|$$

$$\tilde{H}_{AF} = \frac{\hbar \Omega_1}{2} (\sigma_1 + \sigma_1^\dagger) + \frac{\hbar \Omega_2}{2} (\sigma_2 + \sigma_2^\dagger)$$

Nueva base $\{|+\rangle, |-\rangle, |3\rangle\}$

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{\Omega_1^2 + \Omega_2^2}} (\Omega_1 |1\rangle + \Omega_2 |2\rangle) = \cos\theta |1\rangle + \sin\theta |2\rangle$$

$$|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{\Omega_1^2 + \Omega_2^2}} (-\Omega_2 |1\rangle + \Omega_1 |2\rangle) = -\sin\theta |1\rangle + \cos\theta |2\rangle$$


$$\tan\theta = \frac{\Omega_2}{\Omega_1}$$

En la base $\{|+\rangle, |-\rangle, |3\rangle\}$ con $\Delta_1 = \Delta_2 = \Delta$



$$\tilde{H}_A = \hbar \Delta (|+\rangle\langle +| + |-\rangle\langle -|)$$

$$\tilde{H}_{AF} = \frac{\hbar}{2} \sqrt{\Omega_1^2 + \Omega_2^2} (\sigma_+ + \sigma_+^\dagger) \quad \sigma_+ = |+\rangle\langle 3|$$

\therefore El estado $|-\rangle$ no se acopla con la luz



- $\Omega_2 = 0, \Omega_1 \neq 0 \rightarrow |-\rangle = |2\rangle$
- $\Omega_2 \neq 0, \Omega_1 = 0 \rightarrow |-\rangle = |1\rangle$



transferir el sistema de $|2\rangle \rightarrow |1\rangle$ sin pasar por $|3\rangle$.